


SIEMENS

Analoizore Xprecia™

MANEVRAREA APARATULUI STRIDE Manevrarea întindeacuna cu grîji aparatul Stride. Manevrarea cu brutalitate sau impactul cu obiecte dure, spre exemplu în cazul în care aparatul este scutit pe ar, ar putea să deterioreze componentele aparatului și să ducă la obținerea de rezultate incorecte. Puteți utiliza aparatul Stride în următoarele poziții:

- ▲Neat pe o masă sau pe o altă suprafață dură (cu așchiu în sus).
- ▲Întins în mână, în poziție orizontală.
- ▲Întins în mână, la un unghi de 45 de grade în sus sau în jos.



- ▲Nu ruiați o analiză pentru pacient sau un control de calitate QC cu aparatul Stride înțint la unghiuri extreme. În schimb utilizați unghiul vișt gîsrii instrucțiunilor detaliate cu privire la curajare.

REZUMAT ȘI EXPLICAȚII În anul 1955, Quick® a raportat efectele primului test PT. Această analiză a devenit una dintre cele mai utile metode pentru evaluarea cîlt extrinseci și sîli comune a procesului de coagulare. Testul este util pentru monitorizarea terapiei anticoagulante orale, ca de exemplu cu warfarina. Warfarina este un antagonist vitaminic K, care reduce sinteza factorilor II (protrombina), VII, IX și X.

PRINCIPIILE PROCEDURI Warfarina este prescrisă pentru a înfrîna formarea cheagurilor de sînge sau pentru a împiedica dezvoltarea acestora în sistemul sanguin. În timpul dept, lanțeta va fi înșurubată în conformitate cu abia nivelul sanguin de anticoagulanți într-un anumit interval terapeutic stabil de mînuire curant. Medicul trebuie să supravegheze efectul warfarin, pentru a asigura că doza de medicamentului este corectă. Pentru a monitoriza efectul, medicul solicită o analiză PT. Testarea PT este o analiză de sînge care măsoară intervalul de timp necesar pentru coagularea sîngelui, în conformitate cu procedura standard din cadrul instituției dvs.

PREGĂTIREA PROBELOR RECOLATE DE LA PACIENT Pregătiți pacientul pentru recoltarea probei de sînge în conformitate cu procedura standard din cadrul instituției dvs. Spre exemplu, defezațiați degetul cu un tampon cu alcool sau năștiți pacientul în decurs de 5 minute înainte de a pune sîngele în probă de sînge. Ușcați vîrfu degetului înainte de a recolta proba de sînge.

Utilizați numai sînge integral proaspăt recoltat din deget. Împresu cu bandolete de testare. Introduceți în orificiul corespunzător de se analizor. Nu se aplică o probă de sînge în decurs de 10 minute după recoltare. Proba de sînge este absorbită automat, prin capilarele, pînă în zona de reacție a barei de testare, unde sîngele se amestecă cu reactivii și se activează cascada coagulantă. Când Stride detectează că sîngele s-a coagulat, testarea se oprește. Rezultatul PT este calculat și apare pe analizor fie ca INR, fie ca un timp de mînuire de secunde.

Pentru instrucțiuni detaliate, consultați Ghidul utilizatorului furnizat împreună cu analizoarul Xprecia. Dacă aveți întrebări, luați legătura cu echipa de suport tehnic.

REACTIVITATEA Bandetele de testare sunt ambalate în 1 flacon care conține 25 de bucăți. Fiecare bandetă de testare conține reactivul Dade® Innovin®, care este un preparat de factor tisular uman purificat și recombinant, combinat cu fosfolipide sintetice, calcu și stabilizatori.

AVERTISMENTE ȘI ATENȚIONĂRI

- ▲Atunci cînd utilizați aparatul Stride, respectați întotdeauna procedurile și precauțiunile de siguranță indicate în Ghidul utilizatorului.

- Toate componentele aparatului Stride sunt potențial infecțioase și pot transmite agent patogeni cu diseminare sanguină între pacienți și personalul medical. Pentru mai multe informații consultați „Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007” (Indrumător pentru prevenirea de izolare: Prevenirea transmiterii agenților infecțioși în medii spitalicești).

- Se recomandă defezinațrea aparatului după fiecare testare a unui pacient. Puteți utiliza aparatul Stride pentru testarea mai multor pacienți numai atunci cînd sunt respectate toate precauțiunile standard și procedurile recomandate de curajare și defezinațre.

- Utilizați aparatul Stride numai împreună cu lanțeta de unică folosință și cu dezactivare automată și defezinațre.

- Nu înșurubiți bandetele de testare și nu ingerați materialul de control.

- Păstrați întotdeauna bandetele de testare în flacon original, cu capacul închis.

- Utilizați bandetele de testare în intervalul de 10 minute de la scoaterea ei din flacon.

- Aplicați proba de sînge de bandetă de testare în interval de 120 de secunde după afșarea pe ecran a mesajului „Aplicare probă”.

- Purați întotdeauna mînușii de protecție și pregătiți polietile și procedurile din cadrul unității dvs. atunci cînd efectuați analize ale probelor biologice sau cînd utilizați materiale de control.

- Aplicați picături de sînge pe bandetă de testare numai după ce acesta a fost introdus în aparat, Stride a curățat apașa sîngelui.

- Nu utilizați niciodată bandetele de testare îndoit, expirate sau deteriorate.

- Nu scanați un cod de bare al unei bandete de testare, pentru ca apoi să utilizați o altă bandetă, dintr-un alt flacon.

- Fiecare bandetă de testare este de unică folosință și neeficaciă niciodată o altă analiză folosind aceeași bandetă.

- Nu atingeți și nu mișcați bandetă de testare după ce ați aplicat picătura de sînge. Nu mișcați bandetă de testare în timpul efectuării analizei.

- Nu adăugați niciodată sînge suplimentar pe bandetă de testare după ce a început analiza.

- Cea mai bună practică este să vă așchizați că este lumina suficientă pentru a putea efectua o analiză. Consultați următoarele informații cu privire la siguranța generală:

- „Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline-Third Edition” (Protecția personalului de laborator împotriva infecțiilor profesionale: Ghid aprobat - Ediția a treia). Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M29-A3.

- „JDA Public Health Notification: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication” (Notificarea Administrației Federaale pentru Alimentație și Medicamente (FDA): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.fda.gov/medwatch/ucm254925.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- „FDA Public Health Notification: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication” (Notificarea Administrației Federaale pentru Alimentație și Medicamente (FDA): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.fda.gov/medwatch/ucm254925.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

- CDC Clinical Reminder: Use of Fingertick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Blood-borne Pathogens” (Notificarea clinică a Centrului pentru Prevenirea și controlul bolimobilizilor (CDC): Utilizarea lanțetelor la mai mult de o persoană prezintă riscul de transmitere a agenților patogeni cu diseminare sanguină) (2010), care poate fi găsit la adresa <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5912a1.htm>.

SIEMENS

Sustavi Xprecia™

PTINIR TESTE TRAKE PTINIR trake sa Xprecia™ namjenjenje su isključivo za upotrebu na Sistemima Xprecia™ analizatoru Xprecia Stride®. Na analizatoru Stride ne mogu se koristiti druge testne trake.

NAMENA Koagulacijski sustav Xprecia Stride namjenjen je za ispitivanje više pacijenata. Kvalificirani zdravstveni djelatnici koriste ga u svrhu testiranja kvantitativnog protrombinskog vremena (PT) radi praćenja oralne terapije protrombinskim lijekovima. Sveom kontrolom vitamina K. Sustav koristi svježu kapilarnu punu krv (iz prsta). Sustav je namijenjen profesionalnoj (in vitro) dijagnostici i upotrebi na mjestu pružanja hitne pomoći. Iznimno se izvješće uz INR i/ili tipično srednje protrombinsko vrijeme normalne pacijate na 12,0 sekundi.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA SUSTAVA STRIDE Nakon testiranja uzorka pacijenata kao i uzorka kontrolne kvalitete vanjske površine sustava Stride i zaštitni poklopac otvora za test-traku posebno je čistiti i dezinficirati pomoću germicidne maramice koju preporučuje Siemens. Detaljne upute o čišćenju potražite u korisničkom priručniku.

SAŽETAK I OBJAŠNJENJA Quick® je prvi test nastao 1935. PT je jedan od najkorisnijih testova za procjenu vanjskih i uobičajenih putova koagulacije. Test služi kao metoda za nadzor terapije antikoagulacijskim lijekovima kod pacijenata koji uzimaju terapiju varfarinom. K, smanjuje aktivnost faktora II (protrombin), VII, IX, i X.

SJERNICE ZA POSTUPAK Varfarin se propisuje radi sprječavanja nastanka ili povećanja krvnih ugrušaka u krvi i krvnim žilama. Ako se koristi antikoagulacijski lijek, pacijent mora biti upoznat propisanog terapijskog raspona koji određi odobro liječnik. Liječnik treba nadzirati varfarinsku aktivnost kako bi se osiguralo pravilno doziranje do lijeka. U svrhu nadzora aktivnosti liječnik naručuje PT test. PT je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.

PT test je krvni test kojim se mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi, a rezultati se prikazuju kao međunarodni normalizirani odnos (INR) ili sekunde.